



Anhang 1: Hochanfällige Pflanzen

(Stand 12. Juni 2001)

Cotoneaster salicifolius floccosus

Heimat/Herkunft: West-China

Wuchs: Strauch 3-4 m hoch, Zweige überhängend.

Blatt: Immergrün; 4-8 cm lang, schmal lanzettlich mit eingerolltem Blattrand. Oberseite glänzend grün, Unterseite filzig behaart. Blattstiele rötlich-grün, behaart.

Blüte: Im Mai/Juni, in vielen zu 3-4 cm breiten Doldenrispen. Blütenblätter weiss, abstehend. Staubblätter rot. Blüten 7-9 mm breit.

Frucht: kugelig, 4-6 mm lang, rot, matt, teilweise leicht behaart, mit 3 Nüsschen.

Cotoneaster bullatus

Wuchs: Strauchig, breit ausladend, bis ca. 3 m hoch.

Blätter: Sommergrün, länglich bis eiförmig, spitzig, 3-7 cm lang, Oberseite glänzend dunkelgrün, etwas runzelig. Unterseite stark behaart. Halbkreisförmige Blattnarben mit 3 Spuren.

Blüte: Im Mai/Juni, 5-6 mm breit, kugelig mit 5 rosaroten, einwärtsgebogenen Blütenblättern. Kelchblätter breit, sehr kurz, behaart.

Früchte: Leuchtend dunkelrot, glänzend. 8-11 mm breit. Oft leicht behaart.

Knospen: Länglich, oft zugespitzt, halboffen und dicht behaart.

Cotoneaster franchetti

Wuchs: Strauch, bis 2 m hoch, aufrecht, lang überhängende Triebe.

Blätter: Halbimmergrün, an geschützten Orten auch immergrün. 2-3,5 cm lang, oval bis breitlanzettlich. Oberseite glänzend grün, Unterseite silbergrau filzig, Blattrand fein bewimpert.

Blüte: Im Juni, weisslich-rosa, bis 9 mm hoch, an Kurztrieben.

Früchte: Eiförmig, orange-rot, zahlreich, sehr lange haftend, leicht behaart.

Rinde: Dicht graufilzig behaart.

Ansprüche: Auf guten Gartenböden, auch trockenen Standorten, in geschützten Lagen.

Eigenschaften: Bedingt frosthart, Bodenschutz im Winter.

Cotoneaster watereri

Heimat/Herkunft: Cultivar

Wuchs: Strauch 2,5-4 m hoch und meist genauso breit, stark überhängend-niederliegend. Zweige dunkelbraun mit wenigen Lentizellen.

Blatt: Wintergrün-immergrün, 7-10 cm lang, 2,5-4 cm breit, mattgrün, wenig runzelig.

Blüte: Im Juni, weiss, in kleinen Doldentrauben.

Frucht: Hellrot und glänzend, 8-9 mm dick. Zahlreich, in breiten Ständen.

Cotoneaster watereri 'Cornubia'

Heimat/Herkunft: Cultivar.

Wuchs: Sehr stark wachsender grosser Strauch von 4 m Höhe und Breite mit schräg aufwärts gerichteten Zweigen.

Blatt: Wintergrün; sehr gross, bis 10 cm lang und 4 cm breit, ledrig. Oberseite mattgrün, Unterseite hellgrün.

Blüte/Frucht: Blüten im Juni, weiss, in Doldentrauben; Früchte blutrot glänzend, kugelig, in grossen Fruchtständen, September bis Dezember.

Boden/Standort: Keine besonderen Ansprüche; liebt volle Sonne.

Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer'

Heimat/Herkunft: Cultivar

Wuchs: Kriechender Strauch 20-40 cm hoch mit sich schnell ausbreitenden, dem Boden flach aufliegenden und sich bewurzelnden Trieben.

Blatt: Immergrün; 4-6 cm lang, elliptisch, zugespitzt. Oberseite ledrig, dunkelgrün und leicht runzelig; Unterseite hellgrün und kahl.

Blüte/Frucht: Blüten im Juni, weiss; Früchte hellrot, schwach glänzend, kahl, 5-7 mm breit.

Boden/Standort: Keine besonderen Bodenansprüche, verträgt Halbschatten.